



**Clinique NAOUFEL**  
Clinique Médico - Chirurgicale

**Comité de lutte  
contre la douleur**

## **Echelle d'évaluation de la Douleur Aiguë du Nouveau- né (DAN)**

**Référence : CLUD 05**  
**Version : 1**  
**Date de diffusion**  
**Intranet : 10/02/2017**

Cette échelle a été validée pour l'évaluation de la douleur aiguë du nouveau né  
Un score supérieur à 2 est considéré comme signe de douleur,

<b>REPONSES FACIALES</b>	<b>COTATION</b>
- Calme - Pleurniche avec alternance de fermeture et ouverture douce des yeux	0 1
Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : Contraction des paupières, froncement des sourcils, ou accentuation des sillons naso-labiaux:	
- Légers, intermittents avec retour au calme - Modérés - Très marqués, permanents	2 3 4
<b>MOUVEMENTS DES MEMBRES</b>	
- Calmes ou mouvements doux	0
Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants: pédalage, écartement des orteils, membres inférieurs raides et surélevés, agitation des bras, réaction de retrait :	
- Légers, intermittents avec retour au calme - Modérés - Très marqués, permanents	1 2 3
<b>EXPRESSION VOCALE DE LA DOULEUR</b>	
- Absence de plainte - Gémit brièvement. Pour l'enfant intubé, semble inquiet - Cris intermittents. Pour l'enfant intubé, mimique des cris intermittents - Cris de longue durée, hurlement constant. Pour l'enfant intubé, mimique de cris constants	0 1 2 3

